



SPEEDMEDICAL

AZ ÖN EGÉSZSÉGE NEM TŰR KÉSLEKEDÉST

W.: www.speedmedical.hu | E.: info@speedmedical.hu | T.: +36 70 329 0640

■ KÖZPONTI CÍM: 1015 Budapest, Ostrom utca 16.

■ ÜZEMELTETŐ: New Health Kft. | 1015 Budapest, Ostrom utca 16.

PRIMA MEDICA | MinőségRendszer szerint működő egészségügyi szolgáltató

PRIMA MEDICA
MINŐSÉGRENDSZER
— www.primamedica.hu —

BETAJ-0001_20191205

Allergia laboratóriumi vizsgálata (IgE)

Betegtájékoztató

A laboratóriumi allergia tesztek allergénre specifikus IgE ellenanyagokat mutatnak ki vérből. Az allergén specifikus IgE antitestek az allergénnel való találkozáskor keletkeznek, és ezek az antitestek indítják el azt a folyamatot, mely során végül is az allergiára jellemző kellemetlen tünetek jelentkeznek. Ilyen allergének lehetnek például a pollenek, a poratka, az állatszőr, egyes rovarok mérge, bizonyos élelmiszer-összetevők.

Hogyan kell felkészülni a vérvételre?

- éhgyomri állapot nem szükséges
- zsíros ételeket célszerű kerülni a vérvétel előtt /közvetlenül az étkezés után - különösen a zsíros ételek fogyasztásakor a vérben gyorsan felszívódik a zsír, lipémiát okozva, ami a legtöbb laboratóriumi mérést zavarja/

A vizsgálat eredményét befolyásolhatja:

- ételallergia vizsgálat eredményét a diéta befolyásolhatja, a vizsgálat előtt allergológus szakorvossal érdemes egyeztetni, hogy az esetlegesen folytatott diéta mellett érdemes-e elvégezni a laboratóriumi allergia vizsgálatot, megfelelően informatív lesz e így az eredmény
- inhalatív allergének vizsgálata esetén az allergén kerülése befolyásolhatja az eredményt
- immunrendszer működésére ható gyógyszerek szedése – pld. szteroid tartalmú gyógyszerek és immunszuppresszánsok
- primer és szekunder immunrendszeri betegségek fennállta

Antihisztamin tartalmú készítmények használata NEM befolyásolja a vizsgálat eredményét!